



- ▣ FORAM REALIZADAS DUAS FASES DE TREINAMENTO;
- ▣ PREVALECEU A COLETA DE BORBOLETAS, SENDO MUITO BAIXO AS AMOSTRAS DE LIBÉLULAS. NENHUMA AMOSTRA GERAL FOI COLETADA;
- ▣ APESAR DAS DIFICULDADES DE COLETA DEVIDO NÃO UTILIZAÇÃO DO MATERIAL, ESPERA-SE UM MELHOR DESEMPENHO POR PARTE DOS JOVENS PESQUISADORES PARA QUE AUMENTEM

O quadro abaixo mostra o desempenho geral até a 2ª fase de treinamento do projeto realizada em junho/2003.

Comunidade \ Amostra	Borboleta	Libélula	Amostra Geral	Total de amostras
Limão do Curuá	13	16	04	33
Foz do Gurijuba	30	05	24	59
Jaburuzinho	61	18	02	81
Buritizal*	18	02	06	26
Vila Progresso (E. Bosque)*	05	01	01	07
<b>Marinheiro de Fora</b>	<b>15</b>	<b>02</b>	-----	<b>17</b>
Freguesia*	02	18	-----	20
Filadélfia	24	28	21	73
Livramento*	-----	03	01	04
<b>Total de insetos</b>	<b>152</b>	<b>109</b>	<b>59</b>	<b>320</b>

\* Comunidades onde foram realizadas 1ª e 2ª fase, sendo um dia para apresentação, treinamento e coleta e o segundo dia somente coleta e contagem das amostras.



Aulas teóricas com os participantes.



Manuseio de puçá pelos participantes



Aulas práticas sobre coletas com puçá.